

La dermopigmentation ne doit pas être utilisée dans certains cas et doit faire l'objet d'un avis médical :

- Une cicatrice inflammatoire non stabilisée
- Maladies dermatologiques évolutives, maladies infectieuses.
- Maladie chronique de la peau.
- Pathologies ou irritations oculaires.
- Maladies auto-immunes, bien que le pigment soit inerte.
- Désordres systémiques importants (diabète insulino fortement dépendant, allergies graves, Insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque...)
- Tendance à développer des chéloïdes.
- Traitement par la vitamine A acide (Isotrétinoïne)
- Certains profils psychologiques instables et indécis (caractère permanent de la pigmentation).
- Patients immunodéprimés (SIDA, greffes rénales, déficit immunitaire...)
- Il faut noter que les patients sous anti-coagulants (Aspirine), Anti-inflammatoires peuvent être sujets à un hématome, des ecchymoses ou un saignement localisé à la zone d'implantation.
- En cas d'antécédents d'herpès, il est nécessaire de prendre un traitement spécifique avant une pigmentation labiale.
- Du fait d'une interaction possible du pigment avec des injections de comblement (rides, augmentation de lèvres...) il est conseillé d'attendre deux mois entre les deux.

Évitez :

Tout produit exfoliant ou contenant du Rétinol A ou de l'acide glycolique et tout produit de maquillage ou fond de teint, sur la région traitée.

Douches très chaudes et bains prolongés. Pour le bain ou la douche, appliquez au préalable, une généreuse couche de crème ou et gardez votre visage loin de la pomme de douche.

Évitez savons, crèmes et lotions sur la région traitée. Lavez et appliquez seulement sur la région environnante en évitant soigneusement la région pigmentée.

Pas de natation, de saunas ou de Jacuzzi pour une période de 5 à 7 jours.

Évitez l'abus d'alcool car il pourrait causer d'une enflure beaucoup plus importante.

Évitez soleil ou uv jusqu'à complète cicatrisation

Ne pas toucher, frotter ou gratter la région traitée car cela pourrait provoquer une mauvaise cicatrisation et/ou la perte de pigments de couleur.

Ne pas toucher la région traitée sauf pour appliquer les baumes ou onguents vaselinés

LE JOUR DE LA PIGMENTATION APPLIQUEZ 1 A 2 HEURE AVANT UNE CREME ANESTHESIANTE TYPE EMLA QUE VOUS AURA PRESCRIT VOTRE MEDECIN

DESINFECTEZ AVEC BISPETINE ET APPLIQUEZ AU MOINS DEUX FOIS PAR JOUR une crème cicatrisante type homeoplasmine /cicalphate /bepanthen pommade ou la crème vendue par votre esthéticienne.

NB Toute observation inflammatoire importante ou allergique accompagnée ou non d'une infection doit faire l'objet d'une consultation médicale .

RIVABELLA INSTITUT 42 chemin levassor 06210 MANDELIEU
04 93 49 64 54 www.rivabella-institut.com